



---

## **У вашого друга може бути передозування, якщо:**

він не прокидається;

він не робить вдихи кожні  
3–5 секунд;

колір шкіри має синюватий,  
сіруватий чи фіолетовий відтінок,  
або шкіра холодна на дотик.

---

**Якщо ви підозрюєте, що у  
вашого друга передозування,  
телефонуйте за номером 911 і  
дайте йому налоксон (Narcan).**

На території штату Вашингтон діють положення Good Samaritan (Закон доброго самарянина), які захищають вас і ваших близьких від кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків.

# Спосіб використання налоксону

Спочатку переведіть людину в  
положення лежачи.

## Відкрийте упаковку

Не перевіряйте справність спрея.  
Флакон містить лише одну дозу.

## Утримуйте флакон ось так

## Вставте насадку в будь-яку ніздрю

Ваші пальці мають  
торкатися носа людини.

## Натисніть на поршень до кінця



Після цього зробіть людині штучне  
дихання. Якщо вона не прокидається  
впродовж 2–3 хвилин, дайте їй ще одну  
дозу налоксону.

Продовжуйте робити штучне дихання  
та давати налоксон, поки людина не  
отямиться або доки не прибуде допомога.



Дізнайтеся більше за посиланням  
[WAFriendsForLife.com](https://www.wafriendsforlife.com)

Washington State  
Health Care Authority