



Кожен заслуговує
на життя,
**і кожен може стати
другом на все
життя.**

**ЗБЕРЕЖІТЬ
ЖИТТЯ СВОЇМ
ДРУЗЯМ.**

**НОСІТЬ ІЗ СОБОЮ
НАЛОКСОН
(NARCAN).**



Дізнайтеся більше на сайті
WAFriendsForLife.com

Більшість випадків смерті від
передозування в штаті Вашингтон
пов'язана зі зловживанням
фентанілом.

Налоксон запобігає
наслідкам передозування опіоїдів,
зокрема фентанілу.

ФАКТИ ПРО ФЕНТАНІЛ

**Сильнодіючий.
Непередбачуваний. Небезпечний.**

- Фентаніл – потужний синтетичний опіоїд швидкої дії, тож передозування настає за короткий час.
- Можна несвідомо прийняти фентаніл, доданий до таблеток, кокаїну, МДМА або героїну.
- Одна таблетка, «доріжка» або доза може призвести до смертельного передозування.

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ ПРО НАЛОКСОН

Безпечний. Простий у використанні. Легальний.

- Налоксон – це лікарський засіб, що запобігає наслідкам передозування опіоїдів.
- Будь-хто може придбати, носити із собою та використовувати налоксон, АДЖЕ для цього не потрібно проходити спеціальне навчання.
- У багатьох спільнотах налоксон можна отримати безкоштовно. Крім того, ви можете придбати його в аптеці.
- На території штату Вашингтон постійно діє наказ, згідно з яким налоксон можна придбати без рецепта.
- Налоксон не викликає залежність і не може зашкодити, навіть якщо людина не приймала опіоїди.

У ВАШОГО ДРУГА МОЖЕ БУТИ ПЕРЕДОЗУВАННЯ, ЯКЩО:

- він не прокидається;
- він не робить вдихи кожні 3–5 секунд;
- колір шкіри має синюватий, сіруватий чи фіолетовий відтінок, або шкіра холодна на дотик.

Якщо ви підозрюєте, що у вашого друга передозування, телефонуйте за номером 911. Після цього дайте другові налоксон і зробіть штучне дихання.

На території штату Вашингтон діють положення Good Samaritan (Закон доброго самарянина), які захищають вас і ваших близьких від кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків.


СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ НАЛОКСОНУ У ФОРМІ НАЗАЛЬНОГО СПРЕЯ

Спочатку переведіть людину в положення лежачи.

1. Відкрийте упаковку

Не перевіряйте справність спрею.

Флакони містять лише одну дозу.




2. Утримуйте флакон ось так



3. Вставте насадку в будь-яку ніздрю

Ваші пальці мають торкатися носа людини.



4. Натисніть на поршень до кінця

Налоксон почне діяти протягом 2–3 хвилин.

